

Осока японская

Carex japonica Thunb.

Семейство Осоковые — Сурегасеae



Категория и статус. 2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид (в Красной книге Российской Федерации 2008 г. – 3, редкий вид); У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU B2ab(iii); в Красном списке МСОП – LC (вид в целом)); III приоритет природоохранных мер.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение до 40 см выс., с длинным ползучим корневищем и пучками побегов. Общее соцветие из одного верхушечного длинного тычиночного колоска и 2–3 расставленных пестичных колосков. Цветёт в июле, плоды созревают в августе. Размножение вегетативное и семенное.

Распространение. В России встречается в Сахалинской обл. на о. Сахалин в окр. г. Невельска на Крильонском п-ове (Невельский р-н) и на о. Кунашир (между пос. Серноводск и пос. Менделеево и на Курильском перешейке в окр. пос. Южно-Курильск) (Красная книга Сахалинской..., 2019; данные автора-составителя). Вне



России распространён на севере Японии, п-ове Корея и в Сев. Китае (Ohwi, 1965; Егорова Т.В., 1999; Park, 2007; Flora of China, 2010).

Места обитания и особенности экологии. Растёт в ольшаниках и зарослях ольховника с высокотравьем по долинам рек и ручьёв.

Численность. Не изучалась.

Лимитирующие факторы. Малочисленность и изолированность островных популяций, близость местонахождений к населённым пунктам и транспортным коммуникациям.

Принятые меры охраны. Занесён в Красную книгу Сахалинской обл. (2019).

Необходимые дополнительные меры охраны. Исследование численности уже известных популяций и поиск новых местонахождений с целью разработки специальных мероприятий по охране вида на островных территориях.

Автор-составитель. В.Ю. Баркалов.