

Д.К.Куренчиков

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск

Пауки-бокоходы на территории Приамурья представлены двумя семействами: Thomisidae и Philodromidae. Они встречаются в различных биотопах на протяжении всего теплого времени года.

Настоящая работа является результатом трехлетних сборов пауков в долине р.Амур на участке от г.Благовещенска до г.Николаевска-на-Амуре и в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах Хабаровского края: Нанайский район, пос.Славянка; Хабаровский район, хр.Большой Хехцир; Ульчинский район, хребет Скалистый; Бикинский район, стационар "Шивки"; Сидовичский район, станция Приамурская; Верхнебуреинский район, Балкальский хребет; район им.Лазо, р.Кня, Амурский район.

Сборы проводились традиционными способами: кошением энтомологическим сачком по травостой, кронам деревьев и кустарникам, почвенными ловушками, ручной разборкой подстилки, сбором на коре деревьев, постройках и т.д.

Всего собрано около 200 видов пауков из 11 семейств. Доля Thomisidae среди них составляет 7-8%, Philodromidae - 5-6%. Thomisidae представлены 18 видами двух подсемейств: Dietinae (ред. Oxitatae) и Thomisinae. - остальные роды. Наиболее представлены голарктические виды из родов Xisticus и Oxiptila. Присутствуют представители родов тропической фауны: Oxytatae, Synema, Misamenops и Heriades. Великое сходство фауны Thomisidae Приамурья и Японии: Oxytatae strepitosa, Smaragdus piger, Xisticus audax, X. ephippiacus, Oxiptila sinensis, Synema globosum, Misamenops tricaspidatus, Lymnites coronatus, L. minus, Heriades melitoides, Misamena vatia, Pistius undulatus. Для Приамурья и Северной Америки отмечены три общих вида: Misamena vatia, Xisticus emertoni, X. britcheri (Dondale, Redner, 1978).

Из сем. Philodromidae на территории Приамурья собраны представители двух родов: Philodromus и Tibellus. Большинство видов

этого семейства - общие для Приамурья и Северной Америки. Часть видов встречается в Японии: *Philodromus caespitum*, *Ph. rufus*, *Tibellus oblongus*.

Распространение видов указано по следующим работам: Марусик, 1989; Уточкин, 1985, 1989; Ono, 1988; Dondale, Redner, 1978.

Автор благодарит Ю.М.Марусика (ИБС ДВО АН СССР) и Д.В.Могучева (БИ СО АН СССР) за помощь в определении материала, а также Н.А.Рябинина (ИЭП ДВО АН СССР) за ценные замечания по ходу работы.

Сем. Thomisidae

1. *Oxytatae streatipes* G.L.Koch, 1878

Распространение. Россия: Восточное Приамурье, Сахалин, Китай, Корея, Япония.

Материал. Хабаровский край: Славянка, 25.V 1988, 31.V 1990, 6 самцов, 8 самок; Хабаровск, Воронежские сопки, 17.VI 1989, 1 самец, 2 самки; р.Кля, VI 1989, 2 самца (Дьяченко).

Широко распространенный в Хабаровском крае вид, часто доминирующий. Весной встречается в подстилке, летом в кронах деревьев, на кустарниках.

2. *Tmarus piger* (Walckenaer, 1802)

Распространение. Россия: Хабаровский край. Европа, Китай, Корея, Япония.

Материал. Хабаровский край: Славянка, 30.V 1990, 5 самок; Приамурскан, 7.VI 1990, 2 экз.; Хабаровск, Воронежские сопки, 5.VI 1990, 3 самки.

Взрослые самки обитали в кронах деревьев и кустарников на опушках кедрово-широколиственных и широколиственных лесов. Взрослые самцы не встречены.

3. *Xisticus lermovae* Utochkin, 1968

Распространение. Россия: Восточное Приамурье, Приморье, Сахалин.

Материал. Хабаровский край: хр.Большой Хехцир, VI-VI 1990, 18 самцов, 4 самки (Ганин); "Шивка", VII 1990, 5 самок (Ганин).

Вид обитает в подстилке елово-пихтово-кедрового и хвойно-широколиственного лесов.

4. *Xisticus eripipatus* Simon, 1880

Распространение. Россия: Восточная Сибирь, Хабаровский край,

Сахалин, Курильские о-ва. Монголия, Китай, Корея, Япония.

Материал. Хабаровский край: оз.Болонь, 5 км кЗ Ачан, 23.VI 1990, 3 самки; Керебцово, 26.VI 1990, 2 самца; Славянка, 29.VI 1990, 2 самки.

Вид собран на войничковом и войничково-разнотравном лугах и на кочковом болоте.

5. *Xisticus audax* (Schrank, 1803)

Распространение. Палеарктический вид.

Материал. Хабаровский край: окр. Славянка, о-в Славянский, 18.VI 1990, 16 самцов.

Вид собран в почное время почвенными ловушками в ивняке, дубовой ралке, на войничковом лугу.

6. *Xisticus emertoni* Keyserling, 1890

Распространение. Россия: Хабаровский край. Северная Америка.

Материал. Хабаровский край: хр.Большой Хехцир, 12.VI 1990, 1 самка (Дзяченко).

Впервые отмечается для Хабаровского края.

7. *Xisticus vidua* Kulczynski, 1890

Распространение. Россия: Урал, Хабаровский край. Казахстан.

Материал. Хабаровский край, окр. Славянка, о-в Славянский, VII 1989, 2 самки.

Собран в подстилке дубовой ралки. Впервые отмечается для Хабаровского края.

8. *Xisticus britcheri* Gertch, 1934

Распространение. Россия: Хабаровский край. Северная Америка.

Материал. Хабаровский край, Ульчский р-н, пойма р.Амур (445 км фарватера), 25.VI 1990, 2 самки.

Собран в войнике на берегу реки. Впервые отмечается для Хабаровского края.

9. *Oxyptila vinosa* Kulczynski, 1926

Распространение. Россия: от р.Енисей до Камчатки. Япония, Северная Америка.

Материал. Хабаровский край: Баджальский хр., р.Мотда, 6.VIII 1989, 3 самки.

Собран во мху кедрово-стланикового лиственного редколесья на высоте 1000 м.

10. *Oxiptila balkarica* Ovtsharenko, 1979

Распространение. Россия: от Кавказа до Сахалина.

Материал. Хабаровский край: Софийское, УП 1990, 8 самцов (Ганин).

Во мху альника-зеленомошника.

11. *Oxiptila utöchkini* Marus'k et Shevrisov, 1990

Распространение. Россия: Приморский и Хабаровский края.

Материал. Хабаровский край: хр. Большой Хехцир, УИ 1990, 1 самец.

Собран в почвенную ловушку. Впервые отмечается для Хабаровского края.

12. *Luaitheles coronatus* (Grube, 1861)

Распространение. Россия: Приморский и Хабаровский края, Сахалин, Курильские о-ва. Япония.

Материал. Хабаровский край: Славянка, 31.V 1990, 1 самка.

В широколиственном лесу в кронах деревьев.

13. *Luaitheles mais* Opo, 1979

Распространение. Россия: Хабаровский край, Сахалин, Курильские о-ва. Япония, Непал.

Материал. Хабаровский край: окр. Неробцово, УИ 1990, 1 самка.

Собран на войничковом лугу.

14. *Misamenops tricaudatus* (Fabricius, 1775)

Распространение. Палеарктический вид.

Материал. Хабаровский край: окр. Славянка, о-в Славянский; 20.VI 1989, 1 самец, 2 самки; Неробцово, 26.VI 1990, 2 самки; окр. Маринское, о-в Сучу, 27.VI 1990, 2 экз.; Приамурская, 7.VII 1990, 1 самка.

Обычный, широко-распространенный в Приамурье вид.

15. *Misamena vatia* (Clerk, 1758)

Распространение. Голарктический вид.

Материал. Хабаровский край: "Шивки", 28.VIII 1990, 2 самки.

Собран в кронах деревьев хвойно-широколиственного леса.

16. *Merisena mellettei* Simon, 1886

Распространение. Голарктический вид.

Материал. Хабаровский край: Приамурская, 7.VII 1990, 1 самец;

Славянка, VII 1990, 2 самки.

Собран в кронах деревьев и кустарников в малочисленном лесу.

17. *Pistius undulatus* Karsch, 1879

Распространение. Россия: Хабаровский край, Сахалин, Курильские о-ва. Китай, Корея, Япония.

Материал. Хабаровский край: хр. Большой Хемшир, 17.V 1990, 1 самец; Славянка, 27.V 1990, 3 самки; окр. Славянка, о-в Славянский, 21.V 1989, 2 самки; окр. Мариинское, о-в Сучу, 27.VI 1990, 2 самца; оз. Болонь, Ачан, 24.VI 1990, 1 самка.

Обычный в Примурье вид, в первой половине лета собран в лесной подстилке во второй - в кронах деревьев и на ветвях вонючей уту.

18. *Stenema globosum* (Fabricius, 1775)

Распространение. Россия: юг Дальнего Востока. Китай, Корея, Япония.

Материал. Хабаровский край: Славянка, 29.V 1990, 3 самца, 5 самок; Хабаровск, Воронежские сопки. 17.VI 1989, 2 самца.

Собран в различных биотопах: ивняк у подножья сопки, кочковое болото, широколиственный лес.

Сем. Philodromidae

1. *Philodromus bixi* (Simon, 1884)

Распространение. Палеарктический вид.

Материал. Хабаровский край: Жерепцово, 26.VI 1990, 1 самка.

Собран на ветвях в ивняке.

2. *Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802)

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка, Северная Африка.

Материал. Амурская область: Ныловскровское, 25.VI 1988, 3 самца, 3 самки, о-в Сечной, 26.VI 1988, 2 самки; Космодемьяновка, VI 1990, 1 самка (Ганен); о-в Бредный, 20.VI 1988, 1 самка. Хабаровский край: Жерепцово, 26.VI 1990, 1 экз.; окр. Мариинское, о-в Сучу 27.VI 1990, 3 самки.

Обычный в пойме р. Амур вид, собран в кронах деревьев, на луках.

3. *Philodromus emarginatus* (Shrank, 1803)

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка.

Материал. Хабаровский край: Жеребцово, 26.VI 1990, 1 самец, 1 самка.

Собран на опушке мелколистственного леса в кронах деревьев.

4. *Philodromus hirtio* (Latreille, 1819)

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка.

Материал. Амурская область: Космодемьяновка, VI 1990 (Гамин).

Собран в подстилке разнотравного луга.

5. *Philodromus pusillus* (Thorell, 1872)

Распространение. Палеарктический вид.

Материал. Хабаровский край: Солонное, 22.VI 1988, 1 самка.

Собран в кроне березы желтой.

6. *Philodromus rufus* Walckenaer, 1826

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка.

Материал. Амурская область: Новопокровское, 23.VI 1988, 4 самки; о-в Куприяновский, 28.VI 1988, 2 самки. Хабаровский край: Нижнеспаское, 15.VI 1988, 2 самки; о-в Рыбачий, 18.VI 1988, 1 самка; о-в Виноградный, 21.VI 1988, 2 самки; о-в Большой, 19.VI 1988, 1 самка; Славянка, о-в Славянский, 29.VI 1989, 3 самки; Славянка, 29.VI 1990, 2.VIII 1990, 7 самок; о-в Циммермановский, 26.VI 1990, 2 самки; Мариянское, о-в Суч, 27.VI 1990, 1 самка.

Собран на лугах и степнячьих участках. Обычен для пойменных ландшафтов.

7. *Tibellus asiaticus* Kulczynski, 1908

Распространение. Россия: от Байкала до Камчатки. Северная Америка.

Материал. Хабаровский край: Солонное, 23.VI 1988, 1 самка.

В зарослях полыни.

8. *Tibellus marginatus* Clerk, 1751

Распространение. Палеарктический вид.

Материал. Хабаровский край: Нижнеспаское, 15.VI 1988, 2 самца, 2 самки; о-в Средний, 21.VI 1988, 3 самки; о-в Славянский, 24.VI 1989, 5 самцов, 6 самок (Тутти); о-в.Болонь, Ачан, 23.VI 1990, 2 самки; Жеребцово, 26.VI 1990, 2 самки; о-в Циммермановский, 26.VI 1990, 1 самка.

*Собран на лугах и остепненных участках поймы р.Амур.

9. *Tibellus maritimus* (Menge, 1875)

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка.

Материал. Хабаровский край: окр. Мариинское, о-в Сучу, 27.VI 1990, 2 самца.

В траве на склоне сопки.

10. *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка, Северная Африка.

Материал. Хабаровский край: Жерепово, 23.VI 1990, 2 самки; о-в Циммермановский, 26.VI 1990, 3 самки; окр. Богородское, 28.VI 1990, 1 самка; окр. Мариинское, о-в Сучу, 27.VI 1990, 2 самца.

Собран на веерных лугах и в травяном ярусе в широколиственном и хвойно-широколиственном лесах.

Литература

Марусик Ю.М. Два новых вида рода *Xisticus* и замечания по онтогенезу пауков-бокоходов (*Aranei*, *Thomisidae*, *Philodromidae*) Сибири // Зоол. журн. 1989. Т. 68, Вып. 4, С. 140-144.

Уточкин А.С. Материалы к фауне пауков рода *Heriades* (*Aranei*, *Thomisidae*) СССР // Фауна и экология пауков СССР Л.: Изд-во Зоол. ин-та. Тр. Зоол. ин-та, Т. 139, 1985, С. 105-113.

Уточкин А.С. Систематический список пауков рода *Xisticus* (*Arachnidae*, *Aranei*, *Thomisidae*, фауны СССР // Фауна и экология пауков и скорпионов. М.: Наука, 1989. С. 14-16.

Dondale, C.D., J.H.Redner, 1978. The Insects and Arachnids of Canada, Part 5. The Crab Spiders of Canada and Alaska. *Araneae*: *Philodromidae* and *Thomisidae*. 255 p.

Ono H., 1983. A Revisional Study of the Spider Family *Thomisidae* (*Arachnidae*, *Aranei*) of Japan. National Science Museum, Tokyo. 252 p.